

Trip 提前发育。



由 Azurity®
Pharmaceuticals, Inc.
提供的教育材料：

供家长使用

关于 TRIPTODUR® (triptorelin) 缓释注射混悬液： 治疗中枢性性早熟 (CPP)

Triptodur 是一种用于治疗 2 岁及以上儿童的中枢性性早熟 (CPP) 的注射用处方药物。它作为单次肌肉内 (IM) 注射，每 24 周仅需一次，成为首个获得 FDA 批准的每半年一次剂量的 CPP 药物。使用 Triptodur 进行治疗是一种无需手术的方案。

对 CPP 的治疗可以减弱 GnRH 信号对垂体的影响，减少导致青春期的激素释放。通过阻止这些激素的信号，青春期过程将被推迟到治疗结束。预计在停止治疗后 6 到 12 个月内，Triptodur 对垂体和性腺功能的影响将消失。

询问您孩子的医生关于 Triptodur 的信息。

请查看第 14-15 页上 TRIPTODUR 的重要安全信息。





Trip 在学校比朋友们长得高——意外的快速生长突增！



突然间，每个人都开始注意到了。

Trip 也开始注意到其他事情。



声音的变化



身体的变化



红痘痘



有新的气味



和新的感觉

Trip 的父母也注意到了。
所以，他们一起决定去看医生。



医生检查了 Trip 身体的成长情况：

医生通过触摸和观察对 Trip 进行了身体检查。Trip 的父母告诉 Trip，一切都很正常，无需担心。



他们进行了血液检测，以便深入了解 Trip 体内各系统的功能状态。

医生也问了 Trip 父母一些问题。



一张显示 Trip 骨骼生长的 x 光片。



医生说 Trip 很健康，但有些身体只是过早地生长和变化。

孩子们应该享有充分的童年时光，然后再逐渐步入成熟和经历变化的过程。



医生说有一种药物可以帮助减缓变化。

Trip 需要再回来看医生几次，进行体检，看看药物的效果如何。





Trip 明白接受的药物是一次注射，可能会有些疼痛，但医生和护士的和蔼可亲给予了他勇气和安慰。



当一切都结束后，Trip 意识到这并不那么可怕。

随着时间的流逝，Trip 逐渐不再过分关注那些差异。



每个人都会长大。
但正如 Trip 的家人喜欢说的：
“不要急！”

TRIPTODUR 的重要安全信息

TRIPTODUR® (triptorelin) 缓释注射混悬液

适应症

TRIPTODUR 适用于 2 岁及以上患有中枢性性早熟 (CPP) 的儿科患者的治疗。

重要的安全信息

不要在以下情况下使用 TRIPTODUR：

- 对促性腺激素释放激素 (GnRH)、GnRH 激动剂药物或 TRIPTODUR 中的任何成分过敏的人。
- 2 岁以下儿童
- 可能怀孕或已怀孕的妇女

如果您的孩子符合上述任何一种情况，请务必告知您孩子的医疗保健服务者。

重要的是要遵守剂量计划（每 24 周一次注射），以便药物发挥作用。不要漏掉或延迟预定剂量。

一些服用像 TRIPTODUR 这样的促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂的人出现了新的或加重的精神疾病问题。精神疾病问题可能包括情绪症状，如哭泣、易

怒、不安（不耐烦）、愤怒或攻击性行为。如果您的孩子在服用 TRIPTODUR 期间出现任何新的情绪症状或情绪症状加重，请立即致电您孩子的医生。

一些服用 GnRH 激动剂像 TRIPTODUR 的人出现了癫痫发作。癫痫发作的风险在以下人群中可能更高：有癫痫发作史的人、有癫痫疾病史的人、有脑部或脑血管（脑血管性）问题或肿瘤史的人，或者正在使用已知可能引发癫痫发作的药物，如安非他酮或选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)。即使没有这些问题的人也可能出现癫痫发作。如果您的孩子在服用 TRIPTODUR 期间出现癫痫发作，请立即致电您孩子的医生。

一些服用 Triptodur 活性成分 triptorelin 的人出现了严重的过敏反应。如果您的孩子出现以下严重过敏反应的症状，请立即致电您孩子的医生或寻求紧急医疗帮助：皮疹、发红或肿胀、严重瘙痒、荨麻疹、呼吸困难或吞咽困难、心跳加速、出汗、咽喉缩紧感、声音嘶哑、面部、口腔和舌头肿胀、头晕或昏厥。

TRIPTODUR 的重要安全信息 (续)

TRIPTODUR 最常见的副作用包括注射部位反应、月经（阴道）出血、潮热、头痛、咳嗽和感染（支气管炎、胃肠炎、流感、鼻咽炎、外耳炎、咽炎、鼻窦炎和上呼吸道感染）。这些并不是 TRIPTODUR 所有可能的副作用。如果您的孩子有任何副作用困扰他们或不消失，请告诉您孩子的医疗保健提供者。

在您的孩子接受第一次 TRIPTODUR 注射后的最初几周或接受额外注射后，TRIPTODUR 可能会导致一些激素的短暂增加。在这段时间里，您可能会注意到您的孩子更多的青春期迹象，包括阴道出血。如果在接受 TRIPTODUR 后 2 个月内青春期迹象持续，请致电您孩子的医生。

在接受 GnRH 激动剂治疗的儿科患者中观察到假性脑瘤（特发性颅内高压）的报告，包括 triptorelin。如果患者出现以下假性脑瘤症状，包括头痛和视力问题，如视力模糊、复视失明、眼后疼痛或眼球运动疼痛、耳鸣、头晕和恶心，患者和照顾者应立即联系他们的医疗保健提供者。

这些并不是 TRIPTODUR 所有可能的副作用。请致电医生以获取有关副作用的医疗建议。

要报告怀疑的不良反应，请致电 1-800-461-7449 联系 Azurity Pharmaceuticals, Inc.，或者致电 1-800-FDA-1088 或访问 www.fda.gov/medwatch 联系 FDA。

重要的安全信息不包括使用 TRIPTODUR 安全有效所需的所有信息。有关额外的安全信息，请查看 TRIPTODUR 的完整处方信息。

Trip 成长得很快。

但当 Trip 的父母注意到他在成长速度上明显超过了他的朋友们时，他们决定寻求医生的专业意见。

了解更多



Triptodur® 由 Debiopharm Research & Manufacturing SA 代表 Azurity Pharmaceuticals, Inc. 及其适用的关联公司制造。Triptodur® 是 Debiopharm International SA 的注册商标。其他商标是各自所有者的财产。

© 2024 Azurity Pharmaceuticals, Inc. 保留所有权利。PP-TRIP-US-1117