

# Trip y lo que significa crecer antes de lo previsto



Material educativo  
proporcionado por Azurity®  
Pharmaceuticals, Inc.

## **PARA PADRES**

### **Acerca de TRIPTODUR® (triptorelin) para suspensión inyectable de liberación prolongada: Tratamiento para la pubertad precoz central (CPP)**

Triptodur es un medicamento recetado inyectable utilizado para el tratamiento de niños de 2 años de edad o más con pubertad precoz central (central precocious puberty, CPP). Se administra como una única inyección intramuscular (IM) solo una vez cada 24 semanas, lo que la convierte en el primer medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para la CPP en ofrecer una dosis cada seis meses. El tratamiento con Triptodur no requiere cirugía.

Los tratamientos para la CPP debilitan los efectos de la señalización de la hormona GnRH en la hipófisis, lo que reduce la liberación de hormonas que causan la pubertad. Al detener la señalización de estas hormonas, el proceso de pubertad se retrasa hasta el final del tratamiento. Se espera que el efecto de Triptodur en la función de la hipófisis y la gonadal desaparezca en un plazo de seis a doce meses después de interrumpir el tratamiento.

Pregunte al médico de su hijo sobre Triptodur.

**Consulte la Información importante de seguridad para TRIPTODUR en las páginas 14 a 15.**





Trip estaba creciendo más que  
sus amigos del colegio, ¡un  
estirón sorpresa!



Y de repente todos comenzaron  
a notarlo.

Trip también comenzó  
a notar otras cosas.



Una voz cambiada



Un cuerpo diferente



Tenía granitos



Tenía olores nuevos



Y nuevas sensaciones

Los padres de Trip también lo notaron.  
Entonces, juntos, decidieron ir al médico.



## El médico verificó cómo crecía el cuerpo de Trip:

Lo examinó palpando y observando el cuerpo de Trip. Los padres de Trip le dijeron que eso estaba bien.



Una radiografía mostró cómo estaban creciendo los huesos de Trip.

Se extrajo sangre para ver cómo estaba funcionando el cuerpo de Trip.

El médico también hizo algunas preguntas a los padres de Trip.



Trip está saludable, dijo el doctor, pero algunos cuerpos simplemente crecen y cambian demasiado pronto.

Los niños y las niñas necesitan la cantidad de tiempo adecuada para crecer y cambiar.



El médico dijo que hay un medicamento que Trip podría tomar para ayudar a retrasar los cambios.

Trip tendría que volver a ver al médico algunas veces más para realizar controles y ver cómo estaba funcionando el medicamento.






Trip supo que el medicamento es una inyección y que las inyecciones pueden doler, pero el médico y los enfermeros fueron amables y ayudaron a Trip a armarse de valor.



Cuando todo terminó, Trip  
se dio cuenta de que no era  
para tanto.



Ahora, después de un tiempo,  
Trip ya no nota tantas diferencias.





Todos crecemos un día.  
Pero a la familia de Trip le  
gusta decir:

**“¡No hay apuro!”.**

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA TRIPTODUR

## TRIPTODUR® (triptorelin) para suspensión inyectable de liberación prolongada

### INDICACIONES

TRIPTODUR está indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos a partir de los 2 años de edad con pubertad precoz central (CPP).

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No utilice TRIPTODUR en:

- Aquellos alérgicos a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), medicamentos agonistas de GnRH o cualquier ingrediente de TRIPTODUR.
- niños menores de 2 años
- mujeres que están o pueden quedar embarazadas

Informe al proveedor de atención médica de su hijo si cualquiera de las afecciones anteriores se aplica a su hijo.

Es importante cumplir con el cronograma de administración (una inyección cada 24 semanas) para que el fármaco funcione. No omita ni retrase una dosis programada.

Algunas personas que toman agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) como TRIPTODUR han tenido problemas mentales (psiquiátricos) nuevos o que empeoraron. Los

problemas mentales (psiquiátricos) pueden incluir síntomas emocionales como llanto, irritabilidad, inquietud (impaciencia), ira o actuar agresivamente. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta síntomas emocionales nuevos o si estos empeoran mientras toma TRIPTODUR.

Algunas personas que toman agonistas de GnRH como TRIPTODUR han tenido convulsiones. El riesgo de convulsiones puede ser mayor en personas que tienen antecedentes de convulsiones, antecedentes de epilepsia, antecedentes de problemas o tumores en el cerebro o en los vasos cerebrales (cerebrovasculares), que están tomando un medicamento que ha sido conectado con convulsiones, como buproprión o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI). También se han producido convulsiones en personas que no han tenido ninguno de estos problemas. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una convulsión mientras toma TRIPTODUR.

Algunas personas que tomaron triptorelin, el principio activo de TRIPTODUR, han tenido reacciones alérgicas graves. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica de emergencia de inmediato si su hijo presenta alguno de los siguientes síntomas

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA TRIPTODUR (continuación)

de reacción alérgica grave: erupciones cutáneas, enrojecimiento o hinchazón, picazón intensa, urticaria, dificultad para respirar o tragarse, latidos cardíacos rápidos, sudoración, opresión en la garganta, ronquera, hinchazón de la cara, la boca y la lengua, mareos o desmayos.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRIPTODUR incluyen reacciones en el lugar de la inyección, sangrado menstrual (vaginal), sofocos, dolor de cabeza, tos e infecciones (bronquitis, gastroenteritis, gripe, nasofaringitis, otitis externa, faringitis, sinusitis e infección de las vías respiratorias superiores). Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TRIPTODUR. Informe al proveedor de atención médica de su hijo si tiene algún efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

En las primeras semanas después de que su hijo reciba su primera inyección de TRIPTODUR o después de inyecciones adicionales, TRIPTODUR puede causar un breve aumento en algunas hormonas. Durante este tiempo, es posible que note más signos de pubertad en su hija, incluido el sangrado vaginal. Llame al médico de su hijo si los signos de pubertad continúan después de 2 meses de recibir TRIPTODUR.

Se han observado informes de pseudotumor cerebral (hipertensión intracranal idiopática) en pacientes pediátricos que recibieron agonistas de GnRH, incluida la triptorelin. Los pacientes y cuidadores deben comunicarse con su proveedor de atención médica si el paciente desarrolla alguno de los siguientes síntomas de pseudotumor cerebri, incluidos dolor de cabeza y problemas de visión, como visión borrosa, visión doble, pérdida de la visión, dolor detrás del ojo o dolor con el movimiento ocular, zumbido en los oídos, mareos y náuseas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TRIPTODUR. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.


**Para informar REACCIONES ADVERSAS SOSPECHADAS, comuníquese con Azurity Pharmaceuticals, Inc. al 1-800-461-7449, o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)**

**La Información importante de seguridad no incluye toda la información necesaria para usar TRIPTODUR de manera segura y eficaz. Para obtener información de seguridad adicional, consulte la Información de prescripción completa de TRIPTODUR.**

## Trip estaba creciendo muy rápido.

Y cuando los padres de Trip empezaron a notar que Trip iba mucho más adelante que sus amigos, decidieron hablar con un médico.

Más  
información



Triptodur® es fabricado por Debiopharm Research & Manufacturing SA en nombre de Azurity Pharmaceuticals, Inc. y sus filiales correspondientes. Triptodur® es una marca comercial registrada de Debiopharm International SA. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueño(s).

© 2024 Azurity Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. PP-TRIP-US-1120